



Augmentation of Labor

أمتى اعمل Augmentation of Labor، يعنى امتى اعلق سنتو للحالة

لو Bishop Score بتاعها اعلى من او يساوي (≤) ٨

ايه هو Bishop score

©2015 UpToDate®

Export to PowerPoint Print

Modified Bishop scoring system

	0	1	2	3
Dilation, cm	Closed	1 to 2	3 to 4	5 to 6
Effacement, percent	0 to 30	40 to 50	60 to 70	≥80
Station*	-3	-2	-1, 0	+1, +2
Cervical consistency	Firm	Medium	Soft	
Position of the cervix	Posterior	Midposition	Anterior	

A Bishop score ≥ 8 suggests the chances of having a vaginal delivery are good and the cervix is considered favorable or ripe for induction. If the Bishop score is ≤ 6 the chances of having a vaginal delivery are low and the cervix is considered unfavorable or unripe for induction. A simplified Bishop score can be calculated using only dilation, station and effacement. Using these three variables, a simplified Bishop score ≥ 5 has a similar predictive value for vaginal delivery as a classic Bishop score ≥ 8 .

* Based on a -3 to +3 scale.

بالعربي كدة علشان نفهم

ده واحد بيقيس خمس حاجات وببيدهم score يعنى رقم من ٠ الى ٣ لكل حاجة

الخمس حاجات هما

Cx Dilatation, Cx Effacement, Vertex Station, Cx Consistency, Cx position

لو ال score اكبر من او يساوي ٨ لقو ان الستات دول augmentation of labor بيبقى very effective لدرجة ٨٠% منهم بيولدوا vaginal في خلال ٦ ساعات و ٨٠% من ال ٢٠% الباقين يعني كمان ١٦% بيولدوا في خلال ١٢ ساعة و كمان ٣% بيولدوا في خلال ٢٤ ساعة من بدء induction يعني من الآخر الستات دي الي ال score بتاعها اعلى من او يساوي ٨ منهم ٩٩% هيولدوا vaginal وبس ١% هيتحولو قيصرات

لقو كمان ان ال score لو اقل من ٦ ده معناه ان ٢٥% من الحالات دي لو اتعملها induction بتولد section

يعني لو واحدة جاية

- Consistency: Soft = 2
- Cx position: Anterior = 2
- Cx: 6cm = 3
- Eff: 70% = 2
- Station: Zero = 2

يبقى score بتاعها ١١ دي اكيد بنسبة ٩٩,٩% هتولد vaginal كويس لو اتعملها Augmentation سواء كانت "nulliparous" او primigravida او multipara

عكس واحدة مثلا multi جاية

- Consistency: Medium = 1
- Cx: Mid position = 1
- Cx: 3cm = 2
- Eff: 30% = 0
- Station: -2 = 1

يبقى score بتاعها يبقى ٥ دي بنسبة ٢٥% هتولد section وهعلى نسبة failed induction



©2015 UpToDate®

Export to PowerPoint Print

Examples of oxytocin infusion protocols

Regimen	Starting dose, milliunits/minute	Incremental increase, milliunits/minute	Dosage interval, minutes
Low-dose	0.5 to 1	1	30 to 40
Alternative low-dose	1 to 2	2	15 to 30
High-dose	6	6 The incremental increase should be reduced to 3 milliunits/minute if hyperstimulation is present, and reduced to 1 milliunit/minute if recurrent hyperstimulation. Some clinicians limit to a maximum cumulative dose of 10 units and a maximum duration of 6 hours.	15 to 40
Alternative high-dose	4	4	15

الكتب بتقول ببدا ب ٤ الى ٦ ميلل وحدة سنتوسينون "اوكسيتوسين" في الدقيقة وبزود لحد ٢٠ ميللي وحدة في الدقيقة

اقصى جرعة هي ٤٠ ميللي وحدة في الدقيقة

مَشْرِعُ مُحَمَّدٍ ﷺ